

تقييم العادات الفموية الضارة في عينة من مرضى الأسنان السعوديين

زهير أمين مرش، وعمرو محمود عبدالعزيز، وحاتم السيد أمين،

و عبر محمد النويصر

قسم طب وعلوم الفم الوقائي، كلية طب الأسنان، جامعة الملك عبدالعزيز

جدة - المملكة العربية السعودية

أن عدد الإخوة له تأثير دال على
ان السفلية بالعلوية ومص الإصبع.
علاقة إيجابية دالة للمعلومات
لأطفال السعوديين، لتكرار حدوث

المستخلص. الاكتشاف المبكر لحدوث العادات الفموية الضارة عند الأطفال هو ذو أهمية عالية، وذلك لمنع اعوجاج الأسنان، حيث أن هذه العادات قد تكون سبباً لحدوثها. الهدف من البحث: هو قياس نسبة حدوث العادات الفموية السيئة والعوامل المحيية بها عند الأطفال السعوديين من سن السادسة إلى السادسة عشرة. طريقة البحث: تم تصميم هذه الدراسة لمعرفة نسبة الإصابة بهذه العادات بين الجنسين، ولقياس مدى تأثير عدد الأطفال في الأسرة، والمعلومات الصحية للفم والأسنان لحدوث هذه العادات الفموية الضارة بين الطلبة والطلاب السعوديين. تم فحص جميع الزائرين للعيادات الخارجية في كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز وذلك لمعرفة ملائمتهم للمواصفات المطلوبة، وتم تعبئة الاستبيانات من قبل الزائرين أو ذويهم. نتائج البحث: أظهرت أن نسبة حدوث التنفس الفموي وحك الأسنان السفلية بالعلوية ومص الإصبع والضغط على الأسنان كانت على التوالي ١٣,٦٪، ١٦,٧٪، ٣٠,٢٪، ٢٠,٢٪. وأوضحت الدراسة أيضاً أن عادة حك الأسنان السفلية بالعلوية كانت أعلى عند الذكور، وعادة التنفس الفموي ومص الإصبع والضغط على الأسنان أكثر تكراراً عند