

البحث الأول

CLINICAL EFFICACY OF COMBINED PREDNISONE- LEVAMISOLE IN MANAGEMENT OF ORAL LICHEN PLANUS

الفعالية الإكلينيكية الناتجة عن مشاركة بريدنيزون و ليفاميزول في معالجة الحزاز المنبسط
الفموى

- بحث مشترك مع زميلين من نفس التخصص : د/ محمود قنديل - أستاذ مساعد بقسم
طب الفم و علاج اللثة - جامعة القاهرة
 - و د/ نيفين إبراهيم راجى - أستاذ مساعد بقسم طب الفم و علاج اللثة - جامعة القاهرة
منشور فى مجلة
 - سبق تقييمه و تقديره (جيد جدا)
- Cairo Dental Journal. Volume 15, Number 3, September 1999

البحث الأول

CLINICAL EFFICACY OF COMBINED PREDNISON- LEVAMISOLE IN MANAGEMENT OF ORAL LICHEN PLANUS

الفعالية الإكلينيكية الناتجة عن مشاركة بريدنيزون و ليفاميزول في معالجة
الحزاز المنبسط الفموي

ملخص البحث

يعتبر الحزاز المنبسط من الأمراض الإلتهابية المزمنة التي تصيب كل من المخاطية و الجلد و لأسباب غير معروفة. و يلعب الجهاز المناعي دورا أساسيا في العوامل الإمراضية لهذا المرض، حيث تعتبر الستيروئيدات القشرية التي تؤخذ عن طريق الفم هي الدواء الأكثر فعالية في معالجة الحزاز المنبسط الفموي، و لكن بسبب شدة و إزمان المرض فإن الستيروئيدات القشرية يجب أن تؤخذ بجرعات عالية و لفترات طويلة. و لذلك تتطلب الستيروئيدات القشرية المشاركة مع دواء آخر بسبب كثرة أعراضها الجانبية. حيث تم اختيار ليفاميزول لمشاركته مع بريدنيزون لتقليل جرعة الستيروئيدات و أعراضها الجانبية و لتأمين مراقبة المرض.

اظهرت نتائج هذه الدراسة فعالية ملحوظة و جيدة لليفاميزول عند استخدامه بالمشاركة مع أقل جرعة للبريدنيزون في معالجة الحزاز المنبسط الفموي.